



synthos AGRO

IN-PATATA – naturalny nawóz pochodzenia roślinnego do zastosowania w uprawie ziemniaków.



Nawóz dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zawartość składników pokarmowych:

- Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,9 % (m/v)
- Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,3 % (m/v)

Zastosowanie:

- ziemniak

Pojemność: 10 l

Dawkowanie:

- 10 l/ha

Zabiegi:

- Zabieg doglebowy: podczas sadzenia
- Zabieg nalistny: opryskiwać rośliny przed spodziewanym wystąpieniem szkodników takich jak nicień

- Nie zawiera pestycydów
- Mikroelementy zawarte w produkcie występują w formie schelatowanej, która jest najlepiej pobierana i przyswajalna przez rośliny/ziemniaka
- Uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu fermentacji i nie stwarza ryzyka pojawienia się pozostałości w glebie ani w uprawie
- Wchłaniany przez liście i korzenie roślin, a następnie transportowany do obwodowych organów rośliny
- Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach stresu oraz stymuluje je do obrony przed stresami środowiskowymi. Ekstrakty roślinne działają jako naturalne aktywatory fizjologii roślin
- Działa od dwóch do czterech tygodni (w zależności od warunków pogodowych i presji szkodników)

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

Uprawa	Aplikacja			Rekomendacje stosowania
	Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania	Zalecana ilość wody – ciecz użytkowa	Termin stosowania	
Ziemniak	10 l/ha	500 l/ha	Zabieg doglebowy: podczas sadzenia jako startowy nawóz. Zabieg wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej / do redliny)	Wilgotność gleby jest potrzebna, aby zapewnić najlepszą wydajność produktu. W konsekwencji płynne aplikacje można wykonywać podczas niewielkich opadów deszczu lub przed nawadnianiem.
			Zabieg nalistny: opryskiwać rośliny przed spodziewanym wystąpieniem szkodników takich jak nicienie. Powtarzać aplikację nalistną z zachowaniem 3-tygodniowych odstępów.	

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (1 doglebowy + 4 nalistne).

Przygotowanie cieczy użytkowej

W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, niskiej (<5°C) lub wysokiej (>30°C) temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie cieczy roboczej.

Ciecz roboczą przygotować z zachowaniem następującej kolejności: zbiornik opryskiwacza napęlnić do 2/3 objętości wodą, uruchomić mieszadło i dodać odpowiednią ilość nawozu IN-PATATA (informacje w tabeli powyżej). W przypadku przygotowywania tzw. mieszanin zbiornikowych (tank mix) z innymi nawozami, produkt IN-PATATA wlać jako pierwszy. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej objętości.

Rekomendacje do stosowania IN-PATATA

Produkt **IN-PATATA** nie zaleca się stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. **IN-PATATA** można jednak stosować z innymi nawozami. Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji produktu stosowanego łącznie z nawozem.