




synthos
AGRO

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
Dział Obsługi Klienta: +48 33 847 47 77
synthos.agro@synthosgroup.com

WWW.SYNTHOSAGRO.COM




synthos
AGRO



KATALOG PRODUKTOWY

2024



SPIS TREŚCI

- 4 FUNGICYDY
- 10 HERBICYDY
- 18 INSEKTYCYDY
- 20 ZAPRAWY NASIENNE
- 21 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
- 22 REGULATORY WZROSTU
- 24 NAWOZY
- 27 ADIUWANTY

Podane informacje są zgodne ze stanem rejestracji na dzień wydania katalogu i mogą się zmieniać w trakcie sezonu.

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l/kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
KADI® RENOVO 72,5 WG, KAPSTER® RENOVO 72,5 WG, KAPDUO® RENOVO 72,5 WG (substancje aktywne: difenokonazol - 25 g/kg, kaptan - 700 g/kg)			
Jabłoń	Od fazy zielonego pąka do końca fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 56-75).	2 kg Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.	parch jabłoni
	Od fazy, gdy otwartych jest około 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 62-74).	2 kg Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.	mączniak jabłoni
Grusza, Pigwa	Od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 56-81).	2 kg Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.	parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
Niepszutka	Od fazy zielonego pąka do fazy dojrzewania owoców (BBCH 56-81).	2 kg Liczba zabiegów: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.	parch, mączniak prawdziwy
Wiśnia, Cereśnia	Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy gdy owoc osiąga około 60% typowej wielkości (BBCH 71-76).	2 kg	drobna plamistość liści drzew pestkowych
	Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81).		gorzka zgnilizna
	Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy rozrastania zalążni (BBCH 71 -72).		brunatna zgnilizna drzew pestkowych
 MIEDZIAN® 50 WP  (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochloru miedzi - 50% (500gCu/kg))			
Jabłoń	W fazie zielonego pąka (BBCH 0-7). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych zabiegów.	1,5 kg Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	parch jabłoni
	Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60-69).	1,5 kg Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	zaraza ogniowa
	Stosować w okresie wzrostu owoców (BBCH 71).	1,5 kg Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.	

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l/kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
 MIEDZIAN® 50 WP  (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochloru miedzi - 50% (500gCu/kg))			
Grusza	W fazie zielonego pąka (BBCH 0-7). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych zabiegów.	1,5 kg Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	parch gruszy
	Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60-69).	0,75-1,5 kg	zaraza ogniowa
	Stosować w okresie wzrostu owoców (BBCH 71).	0,75-1,5 kg Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	
Cereśnia, Wiśnia	Stosować w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51-61).	1,5-3 kg	rak bakteryjny drzew pestkowych
	W fazie kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców (BBCH 65-73).	1,5-3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	
Brzoskwinia	Stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.	7 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	kędzierzawość liści brzoskwiń
Ogórek (uprawiany w gruncie)	Zabiegi wykonywać od fazy gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (fazy BBCH 62-78).	2,5-3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	bakteryjna kanciasta plamistość
		3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	mączniak rzekomy dyniowatych
Pomidor (uprawiany w gruncie)	Do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (fazy BBCH 51-85). Stosować przemiennie z środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.	2,5-3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość
Pomidor (pod osłonami)	Od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (fazy BBCH 56-88). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.	0,3% (300g/100l) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość
Fasola szparagowa	Od pełni fazy kwitnienia (50 % kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki) - w fazie BBCH 65-69, wykonując 2 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.	3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.	antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
 MIEDZIAN® 50 WP (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500gCu/kg)) 			
Winorośl	Przed kwitnieniem (BBCH 13-17), zaraz po kwitnieniu (BBCH 71-73), w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu (BBCH 73-77).	2,5 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.	mączniak rzekomy winorośli
Czarna porzeczka	Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów (BBCH 59-81).	3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.	antraknoza, rdza wejmutkowo -porzeczkowa, biała plamistość liści
Orzech włoski, orzech laskowy	Bakteryjna zgorzel - od momentu pęknięcia pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Antraknoza - środek stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich.	2-3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.	antraknoza bakteryjna zgorzel
Zatrwan tatarski	W fazie rozety z 15-18 liśćmi.	0,2% (200g na 100l wody) Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.	mączniak rzekomy
 MIEDZIAN® EXTRA 350 SC (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350gCu/l) 			
Jabłoń	W fazie zielonego pąka (BBCH 0-7). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.	1,5l Liczba zabiegów: 1-2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	parch jabłoni
Grusza	W fazie zielonego pąka (BBCH 0-7). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.	1,5 l Liczba zabiegów: 1-2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	parch gruszy
	W okresie kwitnienia (BBCH 60-69).	1,5 l	zaraza ogniowa
	W okresie wzrostu owoców (BBCH 71).	0,75 l Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.	
Czereśnia, Wiśnia	W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51).	3 l	rak bakteryjny drzew pestkowych
	W fazie kwitnienia (BBCH 60).	1,5 l	

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
 MIEDZIAN® EXTRA 350 SC (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350gCu/l) 			
Brzoskwinia	W okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji, lub jesienią.	7 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	kędzierzawość liści brzoskwiń
Ogórek (uprawiany w gruncie)	W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego, w fazy gdy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiąt do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.	2-2,5 l	bakteryjna kanciasta plamistość, środek ogranicza również występowanie mączniaka rzekomego dyniowatych w początkowej fazie wzrostu
Pomidor (uprawiany w gruncie)	W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51-85) 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.	W gruncie: 2-2,5l Pod osłoną: 0,3 % Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość
Pomidor (pod osłonami)	W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, od fazy widocznego szóstego kwiatostanu do fazy w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.	0,3% (300g/100l) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.	zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość
Fasola szparagowa	Od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło: widoczne pierwsze strąki, BBCH 65-69), wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.	2-2,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.	antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń
Winorośl	Przed kwitnieniem (BBCH 13-17), zaraz po kwitnieniu (BBCH 71-73), w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu (BBCH 73-77).	3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni. Wody: 500-900 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.	mączniak rzekomy winorośli

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
 MIEDZIAN® EXTRA 350 SC (substancje aktywne: miedź w postaci tlenochloru miedzi - 350gCu/l) 			
Czarna porzeczka	Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów (BBCH 59-81).	3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.	antraknoza, rdza wejmutkowo -porzeczkowa, biała plamistość liści
Orzech włoski, orzech laskowy	Od momentu pęknięcia pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.	2-3 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.	bakteryjna zgorzel
	Od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich.	2-3 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.	antraknoza
Zatrwian tatarski	Opryskiwać rozety z 15-18 liśćmi.	0,2% (200g na 100l wody) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.	mączniak rzekomy
KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP (substancje aktywne: kaptan - 500 g/kg)			
Jabłoń, grusza	W momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości (BBCH 55-74).	3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.	parch jabłoni, parch gruszy
Wiśnia	Po kwitnieniu drzew owocowych od fazy rozrastania się zalążni do początku dojrzewania, wybarwiania owoców (BBCH 72-81).	3 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.	gorzka zgnilizna wiśni
Fasola szparagowa	W okresie formowania strąków (BBCH 69-71).	1,2 kg Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.	antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa, szara pleśń
TORES® 250 EC, VALOR® 250 EC, WEZEN 250 EC, FERTEN 250 EC, BLUNA 250 EC, HAJMON 250 EC (substancje aktywne: difenokonazol - 250 g/l)			
Jabłoń	Od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).	0,2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.	parch jabłoni
Grusza	Od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).	0,2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.	parch gruszy
Wiśnia, Czereśnia	Od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości. (BBCH 71-78).	0,2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.	drobna plamistość liści drzew pestkowych
Rzepak ozimy	Od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).	0,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1	czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
TORES® 250 EC, VALOR® 250 EC, WEZEN 250 EC, FERTEN 250 EC, BLUNA 250 EC, HAJMON 250 EC (substancje aktywne: difenokonazol - 250 g/l)			
Pszenica ozima	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3. Kolanka do pełni fazy kłoszenia (odslania się 50% kwiatostranu) (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania 2 zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odslania się 30% kwiatostranu do pełni fazy kłoszenia (odslania się 50% kwiatostranu) (BBCH 53-55).	0,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.	Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści(średni poziom skuteczności), septorioza paskowana liści pszenicy(średni poziom skuteczności).
Pszenżyto ozime			Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności).
Ziemniak	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwszego kwiatostranu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91).	0,3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.	Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności)
Burak cukrowy	Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby) do fazy ,gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49).	0,32 l – 0,4 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.	Chwościk buraka
Marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan	Po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).	0,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.	alternarioza, mączniak prawdziwy
Topinambur			zgnilizna twardzikowa
Salsefia			mączniak prawdziwy
Rzepa, brukiew			alternarioza
Burak ćwikłowy	Po zauważeniu pierwszych objawów choroby. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.	0,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.	rdza buraka
Róża uprawiana w polu			mączniak prawdziwy, rdza

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
PREMIER® 300 SL, LIDER 300 SL (substancje aktywne: MCPA - 300 g/l)			
Zboża jare	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożnik polny, szarłat szorstki, samosiowy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
			Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziewnik szorstki
Zboża ozime	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiowy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
			Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek
PREMIER® D 750 SL, LIDER D 750 SL (substancje aktywne: MCPA - 660 g/l, Dikamba - 90 g/l)			
Zboża jare	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	3 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiowy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
		1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty średniowrażliwe: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
PREMIER® D 750 SL, LIDER D 750 SL (substancje aktywne: MCPA - 660 g/l, Dikamba - 90 g/l)			
Zboża jare	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	1,25 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdostówka powojowata (rdost powojowaty), rumian polny, samosiwy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Zboża ozime	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiwy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
		1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski
Zboża jare	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	1,25 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiwy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
		1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
PREMIER® 750 SL, LIDER 750 SL (substancje aktywne: MCPA - 750 g/l)			
Zboża jare	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	0,75 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobółki polne
			Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziwchnik szorstki
Zboża ozime	Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29).	1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobółki polne
			Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek
DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC, HEXYPYR 200 EC (substancje aktywne: fluroksypyr - 200 g/l)			
Żyto ozime Pszenica ozima Przenżyto ozime	Po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32).	0,6-1 l Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziwchnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobółki polne
		1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziwchnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobółki polne

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC, HEXYPYR 200 EC (substancje aktywne: fluroksypyr - 200 g/l)			
Żyto ozime Pszenica ozima Przenżyto ozime	Po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32).	1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziwnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobółki polne
			Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku
Trawniki	Od kwietnia do września. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.	1,9 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: stokrotka pospolita
			Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, brodawnik jesienny, jastrzębiec kosmaczek, mniszek pospolity, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw zwyczajny
MENTUM 040 OD, TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD (substancje aktywne: nikosulfuron - 40 g/l)			
Kukurydza	Po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).	1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity
			Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna
HADAR 360 CS, MARQIS 360 CS (substancje aktywne: chlomazon - 360 g/l)			
Rzepak ozimy	Po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.	0,25 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna
			Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
HADAR 360 CS, MARQIS 360 CS (substancje aktywne: chlomazon - 360 g/l)			
Rzepak ozimy	Po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.	0,33 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyśląd polny, przetacznik rolny, przytulia czepna, tobołki polne
			Chwasty średniowrażliwe: komosa biała
EFFENDI 500 SC, HIPERKAN 500 SC, METKAN 500 SC (substancje aktywne: metazachlor - 500 g/l)			
Rzepak ozimy	Po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-05).	1,5 l + 0,25 l Hadar/Marqis/Chlomazon 360 CS Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska, przytulina czepna, tasznik pospolity
			Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny
	Po wschodach gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).	2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 1 wegetacyjnym.	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska
			Chwasty średniowrażliwe: przytulina czepna, samosiewy zbóż, tasznik pospolity
ESORIO 150 EC, FLUTAX 150 EC (substancje aktywne: fluazyfop-P-butylowy - 150 g/l)			
Rzepak ozimy	Od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBC 12-14).	0,5 l + 1,5 l Oleo 84 EC	samosiewy zbóż
		1,5 l + 1,5 l Oleo 84 EC	perz właściwy (w fazie 4-6 liści)
		0,75 l + 1,5 l Oleo 84 EC	miotła zbożowa
		0,75 l	samosiewy zbóż
		1 l	miotła zbożowa
		2 l	perz właściwy (w fazie 4-6 liści)

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
ESORIO 150 EC, FLUTAX 150 EC (substancje aktywne: fluazyfop-P-butylowy - 150 g/l)			
Kapusta głowiasta biała	Po przyjęciu się rozsady od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14).	2,5l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	samosiewy zbóż, perz właściwy
Burak cukrowy	Od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18).	1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna
Rzepak jary, Len zwyczajny, Słonecznik zwyczajny, Mak lekarski, Gorczyca	Od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14).	0,75 l (solo) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	samosiewy zbóż
		2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	perz właściwy (w fazie 4-6 liści)
		0,1 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	miotła zbożowa
Bobik, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa, groch zielony (uprawiany na strąki), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, tubin biały uprawiany na suche nasiona, tubin żółty uprawiany na suche nasiona, tubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, seradela pastewna, soja, wyka kosmata, wyka siewna (uprawy małoobszarowe)	Po ruszeniu wegetacji i nie później niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 13-50).	2,5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	-

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
CLEMATIS 480 EC (substancje aktywne: chlomazon - 480 g/l)			
Rzepak ozimy	Po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.	0,2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulica czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
		0,25 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny
			Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulica czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
			Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, przetacznik polny
ORKAN® 350 SL (substancje aktywne: MCPA - 90 g/l, glifosat - 260 g/l)			
Drzewa owocowe (Jabłoń, Wiśnia, Czereśnia)	W okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.	5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: chwasznica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
		7 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów	Zwalczane choroby
BALDRON 400 SL, PASAT 400 SL (substancje aktywne: 2,4 D - 160g/l, glifosat - 240 g/l)			
Kostka brukowa, plac magazynowy, tereny przemysłowe jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie. Torowiska kolejowe.	W okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji chwastów.	3 l Zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziwienik szorstki, przytulica czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne
		5 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, stokłosy, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona
			Chwasty średniowrażliwe: pokrzywa zwyczajna
		TERBUT® 500 SC (substancje aktywne: terbutylazyna - 500 g/l)	
Kukurydza	Przedwzrostowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00).	1 l Zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1	Chwasty wrażliwe: fiołek polny, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity
			Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulica czepna, rdestówka powojowata

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka i lub stężenie % / ha	Zwalczane szkodniki
 AKAROL 770 EC (substancje aktywne: olej parafinowany - 770 g/l) 			
Jabłoń	W fazie pęknięcia paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53).	1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	przędziorek owocowiec (stadia zimujące - jaja)
Śliwa	W fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55).	1,75% (1,75 l środka w 100 l wody) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	misecznik śliwowy
Świerk	W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.	1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.	przędziorek sosnowiec (stadia zimujące - jaja)
Modrzew	W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.	1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.	ochojnik świerkowo - modrzewiowy (zimujące stadia - larwy)
Cis	W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.	1,5% (1,5 l środka w 100 l wody) Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.	misecznik cisowiec (stadia zimujące - larwy)
GROT® 18 EC (substancje aktywne: abamektyna - 18 g/l)			
Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor (uprawiane w szklarniach stałych)	Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)	przędziorek chmielowiec
Chryzantema (uprawiane w szklarniach stałych)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie chryzantemy: 2.	przędziorek chmielowiec, wciornastek zachodni
Róża (uprawiane w szklarniach stałych)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Liczba zabiegów: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie róży: 2.	przędziorek chmielowiec

Roślina uprawna	Faza stosowania	Dawka i lub stężenie % / ha	Zwalczane szkodniki
GROT® 18 EC (substancje aktywne: abamektyna - 18 g/l)			
Gerbera (uprawiane w szklarniach stałych)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.	0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody) Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.	miniarki
Truskawka (uprawiana w szklarniach stałych, zastosowanie małoobszarowe)	Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99).	1,2 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	przędziorek chmielowiec
XAPIRO 05 SC (substancje aktywne: fenpiroksymat - 50 g/l)			
Jabłoń	W okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75).	1-1,5 l Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

ZAPRAWY NASIENNE

Roślina uprawna	Dawka (l,kg)/ha	Zwalczane choroby
FUNABEN® PLUS 02 WS (substancje aktywne: tebukonazol - 20 g/kg)		
Pszenica ozima, pszenica jara	150g + 900 ml wody/100kg ziarna	śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek
Jęczmień ozimy, jęczmień jary		głownia pyłaca jęczmienia, zgorzel siewek
PROSEED 050 FS, GRANO 050 FS, DIFLUD 050 FS (substancje aktywne: difenokonazol - 25 g/l, fludioksonil - 25 g/l)		
Pszenica ozima, pszenica jara	200 ml + 800ml wody/100kg ziarna siewnego	fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy
Żyto ozime		fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta
Pszenżyto ozime, owies, jęczmień ozimy, jęczmień jary		fuzaryjna zgorzel siewek
Pszenżyto jare		fuzaryjna zgorzel siewek (średni poziom zwalczania)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Roślina uprawna	Faza stosowania	Zalecane stężenie (w 100 l wody)	Zwalczany szkodnik
K-PAK® (substancje aktywne: trisiloksan polieteryowy)			
Drzewa owocowe: ziarnkowe: jabłoń, grusza pestkowe: śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia	Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników. Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu. W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach.	0,15% - 0,2% (150 - 200 ml preparatu)	mszyce, przędziorki, miodówka gruszoza i jabłoniowa, porzecznic jabłoniowy i śliwow
Śliwa, jabłoń, grusza		0,1% - 0,15% (100 - 150 ml preparatu)	larwy miseczników
Rośliny jagodowe: porzeczka, malina, truskawka		0,2% (200 ml preparatu)	mszyce, przędziorki, wciornastki
Pomidor, fasola, bób, mak skorzonera, szpinak, rabarbar		0,05% - 0,1% (50 - 100 ml preparatu)	mszyce
Pomidor, ogórek i inne dyniowate, fasola i inne rośliny motylkowe grubonasiennne		0,2% (200 ml preparatu)	przędziorki
Rośliny kapustowate: kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, brokuły, kalafior		0,1% (100 ml preparatu)	mączlik warzywny
		0,2% (200 ml preparatu)	mszyce
Ziemniak		0,2% (200 ml preparatu)	mszyce
Czosnek, cebula		0,15% (150 ml preparatu)	wciornastki
Burak ćwikłowy, burak cukrowy		0,2% (200 ml preparatu)	mszyce
		0,05% - 0,1% (50 ml – 100 ml preparatu)	mszyce
Rośliny ozdobne		0,1% - 0,15% (100 - 150 ml preparatu)	przędziorki
Zboża		0,2% (200 ml preparatu)	mszyce
Rzepak		0,15 - 0,2% (150 - 200 ml preparatu)	mszyce

REGULATORY WZROSTU

Uprawa	Dawka (l,kg)/ha	Termin stosowania
POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC, MEROS 250 EC (substancje aktywne: trineksapak etylu - 250 g/l)		
Pszenica ozima	0,4 l Liczba zabiegów: 1.	Od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39). Środek Meros 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Meros 250 EC-0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL-1 l/ha. Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. Kolanka do fazy 3. Kolanka (BBCH 31-33).
Jęczmień ozimy	0,6 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od fazy 1. Kolanka do fazy 4. Kolanka (BBCH 31-34).
Żyto ozime	0,3 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od fazy 1. Kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
Pszenżyto ozime	0,6 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od fazy 1. Kolanka do fazy 2. Kolanka (BBCH 31-32).
Pszenica jara	0,4 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
Jęczmień jary	0,4 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od fazy 1. Kolanka do fazy 2. Kolanka (BBCH 31-32).

REGULATORY WZROSTU

Uprawa	Dawka (l,kg)/ha	Termin stosowania
POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC, MEROS 250 EC (substancje aktywne: trineksapak etylu - 250 g/l)		
Owies siewny	0,4 l Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. Kolanka do fazy 4. Kolanka, w dawkach: Meros 250 EC-0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL-1 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od fazy 1. Kolanka do fazy 4. Kolanka (BBCH 31-34).
Rzepak ozimy	1,5 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55).
Rzepak jary, Rzepak ozimy	1,5 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55).
Żyto jare	0,3 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
Koniczyna czerwona - produkcja nasienna	1,5 l Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.	Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39).
Trawy - produkcja nasienna	0,8 l Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.	Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37).

Uprawa	Dawka (l,kg)/ha	Termin stosowania
KUPROSAL® 50, POWER MIEDŹ 50, MAGIC MIEDŹ 50 (substancje aktywne: miedź (Cu) całkowita - 50% (m/m))		
Jabłonie i grusze	1,5 kg	Gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
Wiśnie i czereśnie	3 kg	Po ruszeniu wegetacji i po zbiorach owoców lub w okresie kwitnienia.
	1,5 kg	Stosować w okresie kwitnienia.
Śliwy	3 kg	Po ruszeniu wegetacji.
	2-3 kg	W okresie opadania liści.
Brzoskwinie	5-7 kg	Bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu liści.
Pomidor	2,5-3 kg	2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
Ogórek	2,5-3 kg	Gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą. Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni.
Winorośl	2,5 kg	Przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.
Porzeczki	3 kg	Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach co 10-14 dni.

Uprawa	Dawka (l,kg)/ha	Termin stosowania
KUPROSAL® 50, POWER MIEDŹ 50, MAGIC MIEDŹ 50 (substancje aktywne: miedź (Cu) całkowita - 50% (m/m))		
Orzech włoski, orzech laskowy	2-3 kg	Od momentu pęknięcia paków do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach co 7-14 dni.
Fasola szparagowa	3 kg	W czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni.
Pozostałe uprawy	0,5-1,0 kg	W okresie intensywnego wzrostu.
IN-CORNO® (substancje aktywne: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6 % (m/m), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/m))		
Kukurydza	10 l	Zabieg doglebowy: można wykonać na dwa sposoby 1) przed siewem tuż przed agregatowaniem (dobrze wymieszać z glebą), 2) podczas siewu jako startowy nawóz, zabieg wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej). Zalecana ilość wody: 500 L/ha.
		Zabieg nalistny: wykonać aplikację we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy (BBCH 12), najlepiej 2-3 tygodnie po siewie. Zalecana ilość wody: 500 L/ha.
Rzepak ozimy	10 l	Zabieg nalistny: wykonać w czasie rozwoju liści: 1) liście nie całkowicie rozwinięte (BBCH 10), 2) faza drugiego liścia (BBCH 12). Zalecana ilość wody: 500 L/ha.
Trawniki, ogrody przydomowe	10 l	Produkt stosować w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, zapobiegawczo, w wilgotnych warunkach. Aplikacje wykonywać w odstępie 2 tygodni. Zaleca się powtarzać aplikacje do późnego lata. Zabiegi wykonywać wieczorem. Zalecana ilość wody: 1000 L/ha.
Szkołki drzew iglastych	10 l	Pierwsza aplikacja podczas sadzenia /przesadzania przez zraszanie, a następnie zaleca się powtórzyć aplikację (2 do 3 razy) z zachowaniem 14-dniowego odstępu. Aplikację należy przeprowadzić ponownie 3 razy od lipca z zachowaniem odstępu 3-4 tygodni. Zalecana ilość wody: 1000 L/ha.

Uprawa	Dawka (kg/ha)	Termin stosowania
IN-PATATA* (substancje aktywne: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/m), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/m))		
Ziemniak	10 l	Zabieg dogłębny: podczas sadzenia jako startowy nawóz (zadziarka z aplikatorem / specjalistycznym rozpylaczem). Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zabieg ratunkowy: zabieg wykonany zapobiegawczo przed wystąpieniem czynnika stresowego dla rośliny. Powtarzać aplikację ratunkową z zachowaniem 3-tygodniowych odstępów. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Marchew, seler (warzywa korzeniowe)	10 l	Zabieg dogłębny: opryskanie gleby przed siewem lub podczas sadzenia jako startowy nawóz. Zabieg wykonaj metodą w furcie (do furki) siewem / do sadzideł, aby produkt znalazł się wokół nasion. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zabieg ratunkowy: BBCH 10, BBCH 12, BBCH 15, BBCH 20, BBCH 40
Truskawka (warzywa ośmioliste)	10 l	Pierwszy zabieg zaraz po sadzeniu, następnie drugi zabieg po 3 tygodniach (zapobiegawczy) i kolejne trzy zabiegi z zachowaniem 2 tygodniowych odstępów. Jeżeli trudniejszą sadzonką w tym samym czasie, wykonaj zabieg w BBCH 19, BBCH 45, BBCH 55, BBCH 65 - ostatni do 3 tygodni przed ostatnim zbiorem. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha (zawieszanie kropielnicowe).
IN-FRUTTO* (substancje aktywne: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 0,5% (m/m), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 1,9% (m/m))		
Drzewa owocowe (jabłko)	10 l	Pierwszy zabieg wykonaj najpóźniej podczas poboru pąków kwiatowych. Powtarzaj aplikację rośliny 2-4 razy w odstępie 2 tygodni. Dodatkowo 1 aplikacja podczas opadania liści, przed zimowaniem. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. *Zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 75 - początek opadania owoców (zimowe opadanie), wcześniej pod uwagę przyjmij warunki pogodowych.

*W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci uszkodzeń - pedziółek, pierwszy zabieg wykonaj około maja. Następnie odstęp powtórz w odstępie 2 tygodni. Kolejną aplikację wykonaj na podstawie obserwacji. Zabieg powtórz 1 lub 2 razy z 2 tygodniowymi odstępami. W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci uszkodzeń - liści korzeniowych, korzeni, pierwszy zabieg wykonaj w sierpniu. Zabieg powtórz po 2 tygodniach (zostawiając). Następnie zabieg wykonaj od połowy września (2 zabieg z 2 tygodniowymi odstępami). W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci uszkodzeń - liści korzeniowych, pierwszy zabieg wykonaj pod koniec sierpnia (początek zimy). Następnie aplikację można powtórzyć w ostatnim mroźnym tygodniu. Zabieg się powtarza: aplikacja do ostatniego lata w sezonie jest ostatnią czynnością. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wynosi: jabłko - 2 zabiegów w 1 roku, reszta owoców - 2 zabiegów rocznie; kiwi, agropy (warzywa) - 3 zabiegów rocznie (łącznie przedzimo - opryskiwanie z aplikacją/głównie, zimowe - opryskiwanie i aplikacja na głązki po zbiorze owoców), szkółki drzew owocowych - 3 zabiegów (zostawiając).

*Zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 75 - początek opadania owoców (zimowe opadanie), wcześniej pod uwagę przyjmij warunki pogodowych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wynosi: jabłko - 3 zabiegów.

Dawka (%, l, kg/ha)	Zastosowanie
HYDRON (substancje aktywne: mieszanka surfaktantów niejonowych)	
Zalecane stężenie adiuwantu HYDRON w cieczy roboczej - 0,2 %.	Adiuwanty do zastosowania z herbicydami dogłębowymi w każdej uprawie otwartej i zamkniętej.
OLEO* 84 EC (substancje aktywne: 84% olej mineralny)	
1,5 l/ha	Można stosować z większością agrotechnika; dla których zalecana jest stosowanie z adiuwantem. OLEO 84 EC zalecany jest do stosowania w zabiegach agronomicznych na dużych powierzchniach uprawowych.

synthos
AGRO

Dzięki wzajemnej
współpracy możemy
osiągać **więcej**

Dołącz do nas:

- SynthosAGRO
- SynthosAGRO ochrona upraw
- z.mysla_o_polskich_plonach



KIEROWNICY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW:

- REJON 01** +48 605 101 192
- REJON 02** +48 508 478 805
- REJON 03** +48 605 101 179
- REJON 04** +48 887 778 799

Do środków ochrony roślin należy stosować z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowanie symboli ostrzeżenia umieszczonych na etykietach produktów.