




**synthos**  
AGRO

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim  
Dział Obsługi Klienta: +48 33 847 47 77  
synthos.agro@synthosgroup.com

[WWW.SYNTHOSAGRO.COM](http://WWW.SYNTHOSAGRO.COM)




**synthos**  
AGRO



# KATALOG PRODUKTOWY 2024





## SPIS TREŚCI

- 4 FUNGICYDY
- 14 HERBICYDY
- 22 INSEKTYCYDY
- 24 ZAPRAWY NASIENNE
- 25 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
- 26 REGULATORY WZROSTU
- 28 NAWOZY
- 31 ADIUWANTY

Podane informacje są zgodne ze stanem rejestracji na dzień wydania katalogu i mogą się zmieniać w trakcie sezonu.



| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                             | Dawka (l/kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                                                                                                                   | Zwalczane choroby                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| KADI® RENOVO 72,5 WG, KAPSTER® RENOVO 72,5 WG, KAPDUO® RENOVO 72,5 WG<br>(substancje aktywne: difenokonazol - 25 g/kg, kaptan - 700 g/kg)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Jabłoń                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Od fazy zielonego pąka do końca fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości (BBCH 56-75).                                                                                                                                | 2 kg<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.                                                                                                                                        | parch jabłoni                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Od fazy, gdy otwartych jest około 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm - faza T (BBCH 62-74).                                                                                                    | 2 kg<br>Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.                                                                                                                | mączniak jabłoni                                   |
| Grusza, Pigwa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania owoców (BBCH 56-81).                                                                                                                                                    | 2 kg<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.                                                                                                                                       | parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych |
| Niepszutka                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Od fazy zielonego pąka do fazy dojrzewania owoców (BBCH 56-81).                                                                                                                                                             | 2 kg<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.                                                                                                                                       | parch, mączniak prawdziwy                          |
| Wiśnia, Czereśnia                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy gdy owoc osiąga około 60% typowej wielkości (BBCH 71-76). | 1,8-2 kg<br>Odstęp między zabiegami:<br>Drobna plamistość liści drzew pestkowych, gorzka zgnilizna 10-14 dni, Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 5-10 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. | drobna plamistość liści drzew pestkowych           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81).                                |                                                                                                                                                                                                                   | gorzka zgnilizna                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy rozrastania zalążni (BBCH 71 -72).                                       |                                                                                                                                                                                                                   | brunatna zgnilizna drzew pestkowych                |
| <div>MIEDZIAN® 50 WP<div>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500 g Cu/kg))</div></div> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Jabłoń                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W fazie zielonego pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych zabiegów.                                                                                                   | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                                                                                                             | parch jabłoni                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60-69).                                                                                                                                                                                 | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                                                                                                             | zaraza ogniowa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stosować w okresie wzrostu owoców (BBCH 71).                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |

| Roślina uprawna                                                                                  | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dawka (l/kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                          | Zwalczane choroby                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MIEDZIAN® 50 WP<br>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500 g Cu/kg)) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                               |
| Grusza                                                                                           | W fazie zielonego pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń, stosować tylko do pierwszych zabiegów.                                                                                                                                                                                                           | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                    | parch gruszy                                                  |
|                                                                                                  | Stosować w okresie kwitnienia (BBCH 60-69).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                    | zaraza ogniowa                                                |
|                                                                                                  | Stosować w okresie wzrostu owoców (BBCH 71).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,75 kg<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                   |                                                               |
| Czereśnia, Wiśnia                                                                                | Stosować w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy początku kwitnienia - otwartych około 10% kwiatów otwartych (BBCH 51-61).                                                                                                                                                                                                   | 3 kg<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                              | rak bakteryjny drzew pestkowych                               |
|                                                                                                  | W fazie kwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców od fazy pełni kwitnienia - przynajmniej 50% kwiatów otwartych do początkowej fazy wzrostu owoców (BBCH 65-73).                                                                                                                                                                       | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                    |                                                               |
| Brzoskwinia                                                                                      | Stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania paków lub jesienią(BBCH 00-03).                                                                                                                                                                                                                                     | 3 kg<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                              | kędzierzawość liści brzoskwiń                                 |
| Ogórek (w uprawie polowej)                                                                       | Zabiegi wykonywać od fazy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.                        | 2,5 kg<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.            | bakteryjna kanciasta plamistość                               |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | mączniak rzekomy dyniowatych                                  |
| Ogórek (w uprawie szklarniowej i pod osłonami)                                                   | Zabiegi wykonywać od fazy kiedy liścienie są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89). Wykonać 2-4 zabiegi w odstępach co 7 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. | 0,16% (160g/100l)<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych |
| Pomidor (w uprawie polowej)                                                                      | Zabiegi wykonywać od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51–85). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.                                                                | 2,0-2,5 kg<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                                       | zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość                        |
| Pomidor (w uprawie szklarniowej i pod osłonami)                                                  | Od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (fazy BBCH 56-88). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.                                                                                                     | 0,25% (250 g/100 l)<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                              | zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowość                        |



| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                                         | Zwalczane choroby                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>MIEDZIAN® 50 WP</b><br/>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500 g Cu/kg))</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                               |
| Fasola szparagowa<br>(uprawiana w gruncie)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Od pełni fazy kwitnienia (50 % kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki) - w fazie BBCH 65-69, wykonując 2 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.                                                                                                      | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                          | antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń                                 |
| Czarna porzeczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stosować od fazy grona, kiedy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone aż do pełni fazy kwitnienia, przynajmniej 50% kwiatów rozwiniętych, opadają pierwsze płatki (BBCH 59-65).                                                                                                                                                                               | 2,4 kg<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.                       | antraknoza, rdza wejmukowo -porzeczkowa, biała plamistość liści               |
| Orzech włoski, leszczyna pospolita                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stosować zapobiegawczo, od momentu pękania pąków przed kwitnieniem kwiatów żeńskich (BBCH 60).                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                         | antraknoza bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego, bakteryjna zgorzel leszczyny |
| Pigwa pospolita, nieszpulka zwyczajna                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Środek stosować zapobiegawczo w fazie rozwoju pąka. Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów (BBCH 00-07).                                                                                                                                                                                                 | 0,9-1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                               | parch gruszy                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środek zastosować w fazie kwitnienia(BBCH 60-69).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni                                                                    | zaraza ogniowa                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środek zastosować na początku fazy wzrostu owoców - owoc osiąga wielkość do 10 mm (BBCH 71).                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5 kg<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami 7-10 dni.                                                                    |                                                                               |
| Morela, śliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Środek zastosować od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy początku kwitnienia - otwartych około 10% kwiatów (BBCH 51-61).                                                                                                                                                                                                                            | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                           | rak bakteryjny drzew pestkowych                                               |
| Oberżyna (syn. bakłażan)<br>(w uprawie polowej)                                                                                                                                                                                                                                                                          | W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości. Środek stosować od początku rozwoju kwiatostanu do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (BBCH 56-85). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. | 2,5 kg<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka                                      |

| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                                                            | Zwalczane choroby                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>MIEDZIAN® 50 WP</b><br/>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 50% (500 g Cu/kg))</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| Oberżyna (syn. bakłażan)<br>(w uprawie szklarniowej i pod osłonami)                                                                                                                                                                                                                                                        | Stosować od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, w której 80% owoców uzyskuje typowa barwę (fazy BBCH 56–88). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.                                                         | 0,25% (25 g/100 l)<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                                                                 | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka                                                                        |
| Cukinia<br>(w uprawie polowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zabiegi wykonywać od fazy, gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62–78). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. | 2,5 kg<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.                                           | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych                                                   |
| Melon, dynia zwyczajna, kawon (syn. arbuz)<br>(w uprawie szklarniowej i pod osłonami)                                                                                                                                                                                                                                      | Zabiegi wykonywać od faz, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 10-89). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.                      | 0,25% (250g/100l)<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.                                | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych |
| Fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy<br>(w uprawie polowej)                                                                                                                                                                                                                                                         | Od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki) (BBCH 65- 69), wykonując zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobą bakteryjną.                                                                              | 3 kg<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.                                             | bakterioza obwódkowa fasoli, antraknoza fasoli, szara pleśń                                                     |
| Siewki i sadzonki modrzewia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.<br>Maksymalna dawka kumulatywna: 8,0 kg środka/ha/rok. | opadzina modrzewiowa                                                                                            |
| Siewki i sadzonki leśnych gatunków liściastych                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.<br>Maksymalna dawka kumulatywna: 8,0 kg środka/ha/rok. | zaraza ogniowa, plamistość liści                                                                                |



| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                   | Zwalczane choroby                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>MIEDZIAN® EXTRA 350 SC</b><br/>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350gCu/l)</div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                               |
| Brzoskwinia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środek zastosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania paków (BBCH 00-03) lub jesienią.                                                                                                                                                                                                                       | 3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                      | kędzierzawość liści brzoskwiń                 |
| Ogórek<br>(uprawiany w gruncie)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zabiegi wykonywać od fazy, gdy na pędzie głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy, gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62-78).<br>Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.            | 2-2,5 l<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3  | bakteryjna kanciasta plamistość               |
| Pomidor<br>(w uprawie polowej)                                                                                                                                                                                                                                                                                | W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51-85) Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.     | 2,0-2,5 l<br>Liczba zabiegów: 3<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                                  | zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość      |
| Pomidor<br>(w uprawie szklarniowej i pod osłonami)                                                                                                                                                                                                                                                            | W okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości, od fazy widocznego szóstego kwiatostanu do fazy w której 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 56-88), Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. | 0,36% (360 ml/100 l)<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                      | zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość      |
| Fasola szparagowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło: widoczne pierwsze strąki, BBCH 65-69), wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.                                                                                  | 2-2,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni. | antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń |

| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faza stosowania                                                                                                                                                      | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                               | Zwalczane choroby                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div><b>MIEDZIAN® EXTRA 350 SC</b><br/>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350gCu/l)</div> <div></div> |                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                                  |
| Jabłoń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W fazie zielonego pąka (BBCH 00-07).<br>Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.                                   | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.                                        | parch jabłoni                                                    |
| Grusza                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W fazie zielonego pąka (BBCH 00-07).<br>Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.                                   | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.                                        | parch gruszy                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W okresie kwitnienia (BBCH 60-69).                                                                                                                                   | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                  | zaraza ogniowa                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W okresie wzrostu owoców (BBCH 71).                                                                                                                                  | 0,75 l<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                 |                                                                  |
| Czereśnia, Wiśnia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | W fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51).                                                                                                                    | 3 l<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                    | rak bakteryjny drzew pestkowych                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W fazie kwitnienia (BBCH 60).                                                                                                                                        | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                          |                                                                  |
| Czarna porzeczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Od fazy grona, kiedy wszystkie pąki kwiatowe są oddzielone aż do pełni fazy kwitnienia, przynajmniej 50% kwiatów rozwiniętych, opadają pierwsze płatki (BBCH 59-65). | 3 l<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. | antraknoza, rdza wejmutkowo -porzeczkowa, biała plamistość liści |
| Orzech włoski, leszczyna pospolita                                                                                                                                                                                                                                                                              | Środek stosować zapobiegawczo, od momentu pękania paków przed kwitnieniem kwiatów żeńskich (BBCH 60).                                                                | 2-3 l<br>Liczba zabiegów: 1.                                                                                  | bakteryjna zgorzel, antraknoza                                   |
| Pigwa pospolita, nieszpuka zwyczajna                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stosować zapobiegawczo w fazie rozwoju pąka (BBCH 00-07). Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.                 | 0,9-1,5 l<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                      | parch gruszy                                                     |



| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                    | Zwalczane choroby                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div><b>MIEDZIAN® EXTRA 350 SC</b><br/>(substancja aktywna: miedź w postaci tlenochlorku miedzi - 350gCu/l)</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                     |
| Pigwa pospolita,<br>nieszpułka zwyczajna                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środek zastosować w fazie kwitnienia<br>(BBCH 60-69).                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                               | zaraza ogniowa                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środek zastosować na początku fazy wzrostu<br>owoców - owoc osiąga wielkość do 10 mm<br>(BBCH 71).                                                                                                                                                                                                                   | 0,75 l<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami 7-10 dni.                                               |                                                                     |
| Morela, śliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Środek zastosować od w fazie nabrzmiewania<br>pąków kwiatowych (BBCH 51).                                                                                                                                                                                                                                            | 3 l<br>Liczba zabiegów: 1.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                                 | rak bakteryjny drzew<br>pestkowych                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Środek zastosować na początku fazy kwitnienia<br>(BBCH 60).                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5 l<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.                                               |                                                                     |
| Ogórek<br>(w uprawie szklarniowej<br>i pod osłonami)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zabiegi wykonywać od fazy kiedy liścienie<br>są całkowicie rozwinięte do fazy pełnej<br>dojrzałości, kiedy wszystkie owoce mają<br>typową barwę (BBCH 10-89). Stosować<br>przemienne ze środkami grzybobójczymi<br>zawierającymi substancje czynne z innych<br>grup chemicznych, odmiennym mechanizmie<br>działania. | 0,23% (230 ml/100 l)<br>Liczba zabiegów: 4.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                       | bakteryjna kanciasta<br>plamistość, mączniak<br>rzekomy dyniowatych |
| Oberżyna (syn. bakłażan)<br>(uprawiana w gruncie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stosować od początku rozwoju kwiatostanu<br>do fazy, w której 50%owoców uzyska typową<br>barwę (BBCH 51-85). Stosować przemienne<br>ze środkami grzybobójczymi zawierającymi<br>substancje czynne z innych grup chemicznych,<br>o odmiennym mechanizmie działania.                                                   | 2,5 l<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 3. | bakteryjna cętkowość,<br>zaraza ziemniaka                           |
| Oberżyna (syn. bakłażan)<br>(w uprawie szklarniowej<br>i pod osłonami)                                                                                                                                                                                                                                                 | Stosować od fazy widocznego 6 kwiatostanu<br>do fazy, w której 80% owoców uzyskuje<br>typowa barwę (fazy BBCH 56–88). Stosować<br>przemienne ze środkami grzybobójczymi<br>zawierającymi substancje czynne z innych grup<br>chemicznych, o odmiennym mechanizmie<br>działania.                                       | 0,36% (360 ml/100 l)<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                       | bakteryjna cętkowość,<br>zaraza ziemniaka                           |

| Roślina uprawna                                                                             | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                          | Zwalczane choroby                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cukinia<br>(uprawiana w gruncie)                                                            | Zabiegi wykonywać od fazy, gdy na pędzie<br>głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy<br>8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy<br>kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 62–78).<br>Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni,<br>przemienne ze środkami grzybobójczymi<br>zawierającymi substancje czynne z innych grup<br>chemicznych, o odmiennym mechanizmie<br>działania.                                  | 2,5 l<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 3.       | bakteryjna kanciasta<br>plamistość, mączniak<br>rzekomy dyniowatych                                                         |
| Melon, dynia zwyczajna,<br>kawon (syn. arbuz)<br>(w uprawie szklarniowej<br>i pod osłonami) | W okresach spodziewanego zagrożenia<br>wystąpienia chorób. Zabiegi wykonywać od<br>faz, gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do<br>fazy pełnej dojrzałości, kiedy wszystkie owoce<br>mają typową barwę (BBCH 10-89). Wykonać<br>2-3 zabiegi, w odstępach co 7 dni, przemienne<br>ze środkami grzybobójczymi zawierającymi<br>substancje czynne z innych grup chemicznych,<br>o odmiennym mechanizmie działania. | 0,36% (360 ml/100 l).<br>Liczba zabiegów: 3.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.                            | bakteryjna kanciasta<br>plamistość, mączniak<br>rzekomy dyniowatych,<br>antraknoza dyniowatych,<br>alternarioza dyniowatych |
| Fasola wielokwiatowa,<br>groch zielony cukrowy<br>(w uprawie polowej)                       | Od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów<br>otwartych) do końca fazy kwitnienia (90%<br>kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki)<br>(BBCH 65-69), wykonując 2-3 zabiegi<br>w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku<br>zagrożenia chorobą bakteryjną.                                                                                                                                                        | 2,5 l kg<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 3.    | bakterioza obwódkowa<br>fasoli, antraknoza fasoli,<br>szara pleśń                                                           |
| <div><b>KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP</b><br/>(substancja aktywna: kaptan - 500 g/kg)</div>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Jabłoń,<br>grusza                                                                           | Stosować zapobiegawczo lub w momencie<br>wystąpienia pierwszych objawów choroby<br>od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy<br>gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości<br>(jabłoń: BBCH 55-74; grusza: BBCH 56-72).                                                                                                                                                                                              | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 4.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.          | parch jabłoni, parch gruszy                                                                                                 |
| Wiśnia                                                                                      | Po kwitnieniu drzew owocowych od fazy<br>rozrastania się zależni do początku<br>dojrzwania, wybarwiania owoców<br>(BBCH 72-81).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 4.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej<br>10-14 dni. | gorzka zgnilizna wiśni                                                                                                      |
| Fasola szparagowa                                                                           | W okresie formowania strąków<br>(BBCH 69-71).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,2 kg<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej<br>7-10 dni.  | antraknoza fasoli,<br>bakterioza obwódkowa,<br>szara pleśń                                                                  |



| Roślina uprawna                                                                                                                         | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                | Zwalczane choroby                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TORES® 250 EC, BLUNA 250 EC, FERTEN 250 EC, HAJMON 250 EC, VALOR® 250 EC, WEZEN 250 EC<br>(substancja aktywna: difenokonazol - 250 g/l) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| Jabłoń                                                                                                                                  | Od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. | parch jabłoni                                                                                                                                                                   |
| Grusza                                                                                                                                  | Od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBCH 57-72).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. | parch gruszy                                                                                                                                                                    |
| Wiśnia,<br>Czereśnia                                                                                                                    | Od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości. (BBCH 71-78).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. | drobna plamistość liści drzew pestkowych                                                                                                                                        |
| Rzepak ozimy                                                                                                                            | Od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienia (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1                                                  | czerrń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa                                                                                                                                        |
| Pszenica ozima                                                                                                                          | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3. Kolanka do pełni fazy kłoszenia (odslania się 50% kwiatostanu) (BBCH 33-55). W przypadku konieczności wykonania 2 zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odslania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odslania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55). | 0,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.  | Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści(średni poziom skuteczności), septorioza paskowana liści pszenicy(średni poziom skuteczności). |
| Pszenżyto ozime                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                | Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności).                                                                                   |
| Ziemniak                                                                                                                                | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwsze-go kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknienia liści (BBCH 51-91).                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.  | Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności)                                                                                                                             |

| Roślina uprawna                                                                                                                         | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                    | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                        | Zwalczane choroby                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TORES® 250 EC, BLUNA 250 EC, FERTEN 250 EC, HAJMON 250 EC, VALOR® 250 EC, WEZEN 250 EC<br>(substancja aktywna: difenokonazol - 250 g/l) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                  |
| Burak cukrowy                                                                                                                           | Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby) do fazy ,gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49). | 0,32 l – 0,4 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. | Chwościk buraka                  |
| Marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan                                                           | Po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89).                                                                                                                                                   | 0,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.         | alternarioza, mączniak prawdziwy |
| Topinambur                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | zgnilizna twardzikowa            |
| Salsefia                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | mączniak prawdziwy               |
| Rzepa, brukiew                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | alternarioza                     |
| Burak ćwikłowy                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | rdza buraka                      |
| Róża uprawiana w polu                                                                                                                   | Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby.                                                                                                                                                                               | 0,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.         | mączniak prawdziwy, rdza         |



| Roślina uprawna                                                                             | Faza stosowania                                                  | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                 | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIER® 300 SL, LIDER 300 SL<br>(substancja aktywna: MCPA - 300 g/l)                       |                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zboża jare<br>(pszenica, jęczmień,<br>pszenżyto, owies)                                     | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>dymnica pospolita,<br>gorczyca polna,<br>komosa biała,<br>ostrożnik polny,<br>szarłat szorstki,<br>samosiewy rzepaku,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                 | Chwasty średnioodporne:<br>jasnota purpurowa,<br>rumian polny.<br>Chwasty odporne:<br>przytulia czepna,<br>rdestówka powojowata<br>(rdest powojowaty)                                                                                                             |
| Zboża ozime<br>(pszenica, jęczmień,<br>pszenżyto, żyto)                                     | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny,<br>dymnica pospolita,<br>mak polny,<br>samosiewy rzepaku,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne                                                                                                                           |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                 | Chwasty średnioodporne:<br>fiołek polny, gwiazdnica<br>pospolita, jasnota<br>purpurowa, maruna<br>bezwonna, rumian polny.<br>Chwasty odporne:<br>przytulia czepna.                                                                                                |
| PREMIER® D 750 SL, LIDER D 750 SL<br>(substancje aktywne: MCPA - 660 g/l, Dikamba - 90 g/l) |                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zboża jare<br>(pszenica jara, jęczmień jary,<br>pszenżyto jare, owies)                      | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>fiołek polny,<br>gorczyca polna,<br>gwiazdnica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>komosa biała,<br>przytulia czepna,<br>rumian polny,<br>samosiewy rzepaku,<br>szarłat szorstki,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne |
|                                                                                             |                                                                  | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty średniowrażliwe:<br>rdestówka powojowata<br>(rdest powojowaty)                                                                                                                                                                                            |

| Roślina uprawna                                                                             | Faza stosowania                                                  | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                    | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIER® D 750 SL, LIDER D 750 SL<br>(substancje aktywne: MCPA - 660 g/l, Dikamba - 90 g/l) |                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zboża jare<br>(pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies)                         | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 1,25 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>fiolka polna,<br>gorczyca polna,<br>gwiazdnica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>komosa biała,<br>przytulia czepna,<br>rdestówka powojowata<br>(rdest powojowaty),<br>rumian polny,<br>samosiwy rzepaku,<br>szarłat szorstki,<br>tasznik pospolity,<br>tobołki polne |
| Zboża ozime<br>(pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto)                      | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>gwiazdnica pospolita,<br>iglica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>mak polny,<br>maruna bezwonna,<br>niezapominajka polna,<br>przytulia czepna,<br>rumian polny,<br>samosiwy rzepaku,<br>tasznik pospolity,<br>tobołki polne                                          |
|                                                                                             |                                                                  | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.    | Chwasty średniowrażliwe:<br>bodziszek drobny, fiołek<br>polny, przetacznik perski                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                  | 1,25 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>gwiazdnica pospolita,<br>iglica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>mak polny,<br>maruna bezwonna,<br>niezapominajka polna,<br>przytulia czepna,<br>rumian polny,<br>samosiwy rzepaku,<br>tasznik pospolity,<br>tobołki polne                                          |
|                                                                                             |                                                                  | 1,25 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty średniowrażliwe:<br>bodziszek drobny, fiołek<br>polny, przetacznik perski                                                                                                                                                                                                                               |



| Roślina uprawna                                                                             | Faza stosowania                                                  | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                    | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIER® 750 SL, LIDER 750 SL<br>(substancja aktywna: MCPA - 750 g/l)                       |                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Zboża jare<br>(pszenica jara, jęczmień jary,<br>pszenżyto jare, owies)                      | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 0,75 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>dymnica pospolita,<br>gorczyca polna,<br>komosa biała,<br>ostrożń polny,<br>samosiewy rzepaku,<br>szarłat szorstki,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty średnioodporne:<br>jasnota purpurowa,<br>rumian polny                                                                                                                   |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty średniowrażliwe:<br>chaber bławatek, fiołek<br>polny, poziewnik szorstki                                                                                                |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty odporne:<br>przytulia czepna,<br>rdestówka powojowata<br>(rdest powojowaty)                                                                                             |
| Zboża ozime<br>(pszenica ozima, jęczmień<br>ozimy, pszenżyto ozime,<br>żyto)                | Od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy (BBCH 21-29). | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny,<br>dymnica pospolita,<br>mak polny,<br>samosiewy rzepaku,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne                                         |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty średniowrażliwe:<br>chaber bławatek                                                                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty średnioodporne:<br>fiołek polny, jasnota<br>purpurowa, maruna<br>bezwonna, rumian polny                                                                                 |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty odporne:<br>gwiazdnica pospolita,<br>przytulia czepna                                                                                                                   |
| HEXYPYR 200 EC, DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC<br>(substancja aktywna: fluroksypyr - 200 g/l) |                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| Żyto ozime<br>Pszenica ozima<br>Przenżyto ozime                                             | Po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka<br>(do BBCH 32).     | 0,6 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.  | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>gwiazdnica pospolita,<br>poziewnik szorstki,<br>przytulia czepna,<br>rdest powojowaty,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne          |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty średniowrażliwe:<br>fiołek polny, jasnota<br>purpurowa, maruna<br>bezwonna                                                                                              |
|                                                                                             |                                                                  |                                                                    | Chwasty odporne:<br>przetacznik perski,<br>samosiewy rzepaku                                                                                                                    |

| Roślina uprawna                                                                             | Faza stosowania                                                                                                | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                 | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEXYPYR 200 EC, DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC<br>(substancja aktywna: fluroksypyr - 200 g/l) |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Żyto ozime<br>Pszenica ozima<br>Przenżyto ozime                                             | Po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka (do BBCH 32).                                                      | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>gwiazdnica pospolita,<br>maruna bezwonna,<br>poziewnik szorstki,<br>przytulia czepna,<br>rdest powojowaty,<br>tasznik pospolity,<br>tobółki polne                                                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średniowrażliwe:<br>fiołek polny,<br>jasnota purpurowa,<br>przetacznik perski,<br>samosiewy rzepaku                                                                                                                                                  |
| Trawniki                                                                                    | Od kwietnia do września.<br>Środek stosować podczas dobrej pogody,<br>w okresie intensywnego wzrostu chwastów. | 1,9 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  | Chwasty wrażliwe:<br>stokrotka pospolita                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średniowrażliwe:<br>babka lancetowata, babka<br>zwyczajna, brodawnik<br>jesienny, jastrzębiec<br>kosmaczek, mniszek<br>pospolity, rdest ptasi, szczaw<br>polny, szczaw zwyczajny                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średnioodporne:<br>koniczyna biała, krwawnik<br>pospolity                                                                                                                                                                                            |
| MENTUM 040 OD, TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD<br>(substancja aktywna: nikosulfuron - 40 g/l) |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kukurydza                                                                                   | Po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).                         | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>gwiazdnica pospolita,<br>tasznik pospolity                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średniowrażliwe:<br>chwastnica jednostronna,<br>maruna bezwonna,<br>przytulia czepna<br>Chwasty odporne: fiołek<br>polny, komosa biała,<br>rdestówka powojowata                                                                                      |
| HADAR 360 CS, MARQIS 360 CS<br>(substancja aktywna: chlomazon - 360 g/l)                    |                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rzepak ozimy                                                                                | Po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni),<br>na starannie uprawioną (bez grud) glebę.                           | 0,25 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>gwiazdnica pospolita,<br>kurzyśląd polny,<br>przetacznik rolny,<br>przytulia czepna                                                                                                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średniowrażliwe:<br>komosa biała, tobółki polne                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             |                                                                                                                |                                                                 | Chwasty odporne: bodziszek<br>drobny, chaber bławatek,<br>fiołek polny, gorczyca polna,<br>iglica pospolita, kostrzewa<br>trzciniowa, maruna<br>bezwonna, niezapominajka<br>polna, przetacznik perski,<br>samosiewy zbóż, wyka ptasia,<br>wilczomlec obrotny |



| Roślina uprawna                                                                                      | Faza stosowania                                                                                                                                                          | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                       | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HADAR 360 CS, MARQIS 360 CS<br>(substancja aktywna: chlomazon - 360 g/l)                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rzepak ozimy                                                                                         | Po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni),<br>na starannie uprawioną (bez grud) glebę.                                                                                     | 0,33 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.                                    | Chwasty wrażliwe:<br>gwiazdnica pospolita,<br>kurzyśląd polny,<br>przetacznik rolny,<br>przytulia czepna,<br>tobołki polne                                                                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Chwasty średniowrażliwe:<br>komosa biała                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Chwasty odporne:<br>bodziszek drobny, chaber<br>bławatek, fiołek polny, gorczyca<br>polna, iglica pospolita,<br>kostrzewa trzcinowa, maruna<br>bezwonna, niezapominajka<br>polna, przetacznik perski,<br>samosiewy zbóż, wyka ptasia,<br>wilczomlec obrotny |
| EFFENDI 500 SC, HIPERKAN 500 SC, METKAN 500 SC<br>(substancja aktywna: metazachlor - 500 g/l)        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rzepak ozimy                                                                                         | Po siewie, ale przed wschodami rzepaku<br>(BBCH 00-05).                                                                                                                  | 1,5 l + 0,25 l Marqis 360 CS/Hadar 360 CS<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny,<br>gwiazdnica pospolita,<br>maruna nadmorska,<br>przytulina czepna,<br>tasznik pospolity                                                                                                                             |
|                                                                                                      | Po wschodach gdy rośliny rzepaku mają<br>co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12),<br>a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści<br>(przytulia czepna w fazie liścieni). | 2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 1<br>wegetacyjnym.                                        | Chwasty średniowrażliwe:<br>fiołek polny                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny,<br>gwiazdnica pospolita,<br>maruna nadmorska                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | Chwasty średniowrażliwe:<br>przytulina czepna,<br>samosiewy zbóż,<br>tasznik pospolity<br>Chwasty odporne:<br>fiołek polny.                                                                                                                                 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FLUTAX 150 EC, ESORIO 150 EC, GRASTOP 150 EC<br>(substancja aktywna: fluazyfop-P-butyłowy - 150 g/l) |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rzepak ozimy                                                                                         | Od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBC 12-14).                                                                                                                             | 0,5 l + 1,5 l Oleo 84 EC                                                                              | samosiewy zbóż                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 1,5 l + 1,5 l Oleo 84 EC                                                                              | perz właściwy<br>(w fazie 4-6 liści)                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 0,75 l + 1,5 l Oleo 84 EC                                                                             | miotła zbożowa                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 0,75 l                                                                                                | samosiewy zbóż                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 1 l                                                                                                   | miotła zbożowa                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 2 l                                                                                                   | perz właściwy<br>(w fazie 4-6 liści)                                                                                                                                                                                                                        |

| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Faza stosowania                                                                         | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                   | Zwalczane chwasty                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FLUTAX 150 EC, ESORIO 150 EC, GRASTOP 150 EC<br>(substancja aktywna: fluazyfop-P-butyłowy - 150 g/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                                            |
| Kapusta głowiasta biała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Po przyjęciu się rozsady od fazy 2 liści<br>do fazy 4 liści (BBCH 12-14).               | 2,5l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.  | samosiwy zbóż,<br>perz właściwy            |
| Burak cukrowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Od fazy 2 liści do fazy 8 liści<br>(BBCH 12-18).                                        | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.   | samosiwy zbóż,<br>chwastrnica jednostronna |
| Rzepak jary,<br>Len zwyczajny,<br>Słonecznik zwyczajny,<br>Mak lekarski, Gorczyca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Od fazy 2 liści do fazy 4 liści<br>(BBCH 12-14).                                        | 0,75 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym 1. | samosiwy zbóż                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.   | perz właściwy<br>(w fazie 4-6 liści)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | 0,1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | miotła zbożowa                             |
| Bobik, bób, fasola uprawiana<br>na suche nasiona, fasola<br>szparagowa, groch zielony<br>(uprawiany na strąki), groch<br>zwyczajny siewny uprawiany<br>na suche nasiona, groch<br>zwyczajny pastewny<br>uprawiany na suche nasiona,<br>tubin biały uprawiany na<br>suche nasiona, tubin żółty<br>uprawiany na suche nasiona,<br>tubin wąskolistny uprawiany<br>na suche nasiona, seradela<br>pastewna, soja, wyka<br>kosmata, wyka siewna<br>(uprawy małoobszarowe) | Po ruszeniu wegetacji i nie później niż<br>do fazy rozwoju kwiatostanu<br>(BBCH 13-50). | 2,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | -                                          |



| Roślina uprawna                                                          | Faza stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                 | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLEMATIS 480 EC<br>(substancja aktywna: chlomazon - 480 g/l)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Rzepak ozimy                                                             | Po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. | 0,2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.  | Chwasty wrażliwe:<br>gwiazdnica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>przytulica czepna,<br>tasznik pospolity,<br>tobołki polne                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Chwasty średniowrażliwe:<br>przetacznik polny<br>Chwasty odporne:<br>chaber bławatek, fiołek polny,<br>komosa biała, mak polny,<br>maruna bezwonna,<br>przetacznik perski, samosiewy<br>zbóż, żóttlica drobnokwiatowa.   |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Chwasty wrażliwe:<br>gwiazdnica pospolita,<br>jasnota purpurowa,<br>przytulica czepna,<br>tasznik pospolity,<br>tobołki polne                                                                                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. | Chwasty średniowrażliwe:<br>komosa biała,<br>przetacznik polny<br>Chwasty odporne: chaber<br>bławatek, fiołek polny, mak<br>polny, maruna bezwonna,<br>przetacznik perski,<br>samosiewy zbóż, żóttlica<br>drobnokwiatowa |
| ORKAN® 350 SL<br>(substancje aktywne: MCPA - 90 g/l, glifosat - 260 g/l) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
| Drzewa owocowe<br>(Jabłoni, Wiśni, Czereśni)                             | Stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.                                                                                                                                                  | 5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>chwastnica jednostronna,<br>gwiazdnica pospolita,<br>komosa biała,<br>starzec zwyczajny,<br>tasznik pospolity,<br>wiechlina roczna                                                                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.    | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny,<br>mniszek pospolity,<br>perz właściwy,<br>powój polny,<br>rdest ptasi,<br>skrzyp polny,<br>ślaz zaniedbany,<br>wierzbownica gruczołowata                                         |

| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faza stosowania                                                                            | Dawka (l,kg)/ha, ilość zabiegów                                                                                                                                               | Zwalczane chwasty                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALDRON 400 SL, PASAT 400 SL<br>(substancje aktywne: 2,4 D - 160 g/l, glifosat - 240 g/l)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kostka brukowa,<br>place magazynowe,<br>tereny przemysłowe jak<br>również inne stałe<br>konstrukcje o twardych<br>lub półprzepuszczalnych<br>powierzchniach, na których<br>ma miejsce niepożądany<br>silny wzrost chwastów<br>i konieczne jest ich<br>całkowite wyeliminowanie.<br>Torowiska kolejowe. | W okresie intensywnego wzrostu roślin<br>zielonych przez cały okres wegetacji<br>chwastów. | 3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.                                                                                                               | Chwasty wrażliwe:<br>bodziszek drobny, fiołek polny,<br>gwiazdnica pospolita, jasnota<br>purpurowa, kostrzewa<br>czerwona, krwawnik pospolity,<br>maruna bezwonna, przytulia<br>czepna, tasznik pospolity,<br>wiechlina roczna            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | 5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.                                                                                                               | Chwasty wrażliwe:<br>babka lancetowata, bylica<br>pospolita, komosa biała,<br>mniszek lekarski, perz właściwy,<br>rdest ptasi, starzec zwyczajny,<br>stokłosy, wiechlina zwyczajna,<br>włośnica zielona                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Chwasty średniowrażliwe:<br>pokrzywa zwyczajna                                                                                                                                                                                            |
| TAZOPRYM 500 SC, TERBUT® 500 SC<br>(substancja aktywna: terbutylazyna - 500 g/l)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kukurydza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stosować powschodowo od fazy 2 do fazy 6<br>liści kukurydzy (BBCH 12-16).                  | 1 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1.                                                                                                               | Chwasty wrażliwe:<br>fiołek polny,<br>komosa biała,<br>maruna nadmorska,<br>przytulia czepna,<br>przetacznik polny,<br>psianka czarna,<br>rdestówka powojowata,<br>rumianek pospolity,<br>szarłat szorstki,<br>tasznik pospolity          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Chwasty średniowrażliwe:<br>chaber bławatek,<br>gwiazdnica pospolita                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedwschodowo w fazie suchego ziarniaka<br>(BBCH 00)                                      | Zastosowanie w mieszaninie z adiuwantem<br><br>Terbut 500 SC/ Tazoprym 500 SC - 1,0 l/ha +<br>HYDRON 0,2 l/ha<br><br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie<br>wegetacyjnym: 1. | Chwasty wrażliwe:<br>fiołek polny, maruna<br>nadmorska, szarłat szorstki,<br>tasznik pospolity                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Chwasty średniowrażliwe:<br>bodziszek drobny, chaber<br>bławatek, gwiazdnica<br>pospolita, komosa biała<br>przytulia czepna, rdestówka<br>powojowata                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Powschodowo od fazy 2 do fazy 6 liści<br>kukurydzy (BBCH 12-16).                           |                                                                                                                                                                               | Chwasty wrażliwe: fiołek polny,<br>gwiazdnica pospolita, komosa<br>biała, maruna nadmorska,<br>przetacznik polny, przytulia<br>czepna, psianka czarna,<br>rdestówka powojowata,<br>rumianek polny, szarłat<br>szorstki, tasznik pospolity |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                               | Chwasty średniowrażliwe:<br>chaber bławatek                                                                                                                                                                                               |



| Roślina uprawna                                                                                                                                                                                                                                                                           | Faza stosowania                                                                         | Dawka I lub stężenie % / ha                                                                                                                                                                     | Zwalczane szkodniki                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>AKAROL 770 EC</div><div>(substancja aktywna: olej parafinowany - 770 g/l)</div><div></div></div> |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Jabłoń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W fazie pękania paków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni (BBCH 53). | 1,5%<br>(1,5 l środka w 100 l wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                                                    | przędziorek owocowiec<br>(stadia zimujące - jaja)                |
| Śliwa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W fazie zielonego pąka śliwy (BBCH 55).                                                 | 1,75%<br>(1,75 l środka w 100 l wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                                                  | misecznik śliwowy                                                |
| Świerk                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.                                  | 1,5%<br>(1,5 l środka w 100 l wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.                                                                                          | przędziorek sosnowiec<br>(stadia zimujące - jaja)                |
| Modrzew                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.                                  | 1,5%<br>(1,5 l środka w 100 l wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.                                                                                          | ochojnik świerkowo<br>- modrzewiowy<br>(zimujące stadia - larwy) |
| Cis                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji.                                  | 1,5%<br>(1,5 l środka w 100 l wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów przed danym sezonem wegetacyjnym: 1.                                                                                          | misecznik cisowiec<br>(stadia zimujące - larwy)                  |
| <div><div></div><div>GROT® 18 EC</div><div>(substancja aktywna: abamektyna - 18 g/l)</div><div></div></div>                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Oberżyna, ogórek, papryka, pomidor<br>(uprawiane w szklarniach stałych)                                                                                                                                                                                                                   | Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.                    | 0,05%<br>(50 ml środka w 100 litrach wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.                                              | przędziorek chmielowiec                                          |
| Chryzantema<br>(uprawiana w szklarniach stałych)                                                                                                                                                                                                                                          | Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.            | 0,05%<br>(50 ml środka w 100 litrach wody)<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie chryzantemy: 2. | przędziorek chmielowiec,<br>wciornastek zachodni                 |
| Róża<br>(uprawiana w szklarniach stałych)                                                                                                                                                                                                                                                 | Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.            | 0,05%<br>(50 ml środka w 100 litrach wody)<br>Liczba zabiegów: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie róży: 2.        | przędziorek chmielowiec                                          |

| Roślina uprawna                                                                                                              | Faza stosowania                                                                                                                                                              | Dawka I lub stężenie % / ha                                                                                                                        | Zwalczane szkodniki                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>GROT® 18 EC</div><div>(substancja aktywna: abamektyna - 18 g/l)</div><div></div></div>                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                   |
| Gerbera<br>(uprawiane w szklarniach stałych)                                                                                 | Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.                                                                                                 | 0,05%<br>(50 ml środka w 100 litrach wody)<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. | miniarki                                          |
| Grusza                                                                                                                       | Środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń.                                                                                       | 0,75 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                                    | miodówka gruszkowa<br>plamista                    |
| Malina, jeżyna                                                                                                               | Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń (BBCH 00-99).                                                                                    | 0,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.<br>Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 28 dni.                                   | przędziorek chmielowiec                           |
| Truskawka<br>(uprawiana w szklarniach stałych, zastosowanie małoobszarowe)                                                   | Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99).                       | 1,2 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.                                                                                     | przędziorek chmielowiec                           |
| <div><div></div><div>XAPIRO 05 SC, PIROX 05 SC</div><div>(substancja aktywna: fenpiroksymat - 50 g/l)</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                   |
| Jabłoń                                                                                                                       | Stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75). | 1-1,5 l<br>Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.    | przędziorek owocowiec,<br>przędziorek chmielowiec |



# ZAPRAWY NASIENNE

| Roślina uprawna                                                                                                                               | Dawka (l,kg)/ha                                                                                                                               | Zwalczane choroby                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROSEED® 050 FS, GRANO® 050 FS, DIFLUD 050 FS, ZAPRAWA NASIENNA 050 FS<br>(substancje aktywne: difenokonazol - 25 g/l, fludioksonil - 25 g/l) |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Pszenica ozima, pszenica jara                                                                                                                 | 200 ml + 800ml wody/100kg ziarna siewnego                                                                                                     | fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy                                    |
| Żyto ozime                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa<br>głownia żdźbłowa żyta                    |
| Jęczmień ozimy                                                                                                                                |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa,<br>pasiastość liści jęczmienia             |
| Pszenżyto jare                                                                                                                                |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek<br>(średni poziom zwalczania)                               |
| Pszenżyto ozime                                                                                                                               |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek,<br>pleśń śniegowa                                          |
| Jęczmień jary                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek,<br>pasiastość liści jęczmienia                             |
| Owies                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek                                                             |
| FLUDIO ŻEL 025 FS<br>(substancja aktywna: fludioksonil - 25 g/l)                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Pszenica ozima                                                                                                                                | 200 ml/100 kg ziarna siewnego<br><br>zalecana ilość wody: 0 - 800 ml/<br>100 kg ziarna siewnego<br>(możliwe zaprawianie z i bez dodatku wody) | fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw,<br>śnieć cuchnąca pszenicy     |
| Pszenica jara                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy                                    |
| Żyto ozime                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek, głownia żdźbłowa żyta                                      |
| Pszenżyto ozime,<br>jęczmień jary                                                                                                             |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek                                                             |
| Jęczmień ozimy                                                                                                                                |                                                                                                                                               | fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw,<br>pasiastość liści jęczmienia |

# PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

| Roślina uprawna                                                                                                          | Faza stosowania                                                                                                                                                                                | Zalecane stężenie (w 100 l wody)        | Zwalczany szkodnik                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K-PAK®<br>(substancja aktywna: trisiloksan polieteryowy)                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                |
| Drzewa owocowe:<br><b>ziarnkowe:</b> jabłoń, grusza<br><b>pestkowe:</b> śliwa, wiśnia,<br>czereśnia, morela, brzoskwinia | Stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii szkodników.<br><br>Preparat utrzymuje swoją skuteczność do 14 dni po zabiegu.<br><br>W razie konieczności zabieg powtórzyć po 14 dniach. | 0,15% - 0,2% (150 - 200 ml preparatu)   | mszyce, przędziorki,<br>miodówka gruszoza<br>i jabłoniowa, pordzewiacz<br>jabłoniowy i śliwowy,<br>wciornastki |
| Śliwa, jabłoń, grusza                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 0,1% - 0,15% (100 - 150 ml preparatu)   | larwy miseczników                                                                                              |
| Rośliny jagodowe: porzeczka,<br>malina, truskawka                                                                        |                                                                                                                                                                                                | 0,15% - 0,2% (150-200 ml preparatu)     | mszyce, przędziorki,<br>wciornastki, mączlik,<br>wielkopąkowiec porzeczkowy                                    |
| Pomidor, fasola, bób, mak<br>skorzoneira, szpinak, rabarbar,<br>burak ćwikłowy                                           |                                                                                                                                                                                                | 0,05% - 0,1% (50 - 100 ml preparatu)    | mszyce                                                                                                         |
| Pomidor, ogórek i inne<br>dyniowate, fasola i inne rośliny<br>motylkowe grubonasiennne                                   |                                                                                                                                                                                                | 0,2% (200 ml preparatu)                 | przędziorki                                                                                                    |
| Rośliny kapustowate: kapusta<br>włoska, jarmuż, kapusta<br>pekińska, brokuły, kalafior                                   |                                                                                                                                                                                                | 0,05% - 0,1% (50-100 ml preparatu)      | mączlik warzywny                                                                                               |
| Ziemniak                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | 0,2% (200 ml preparatu)                 | mszyce                                                                                                         |
| Czosnek,<br>cebula                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | 0,15% (150 ml preparatu)                | wciornastki (ograniczenie<br>występowania szkodników)                                                          |
| Burak cukrowy,<br>burak ćwikłowy                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | 0,2% (200 ml preparatu)                 | mszyce (ograniczenie<br>występowania szkodników)                                                               |
| Rośliny ozdobne                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 0,05% - 0,1% (50 ml – 100 ml preparatu) | mszyce                                                                                                         |
| Zboża                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                | 0,1% - 0,15% (100 - 150 ml preparatu)   | przędziorki                                                                                                    |
| Rzepak                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | 0,2% (200 ml preparatu)                 | mszyce (ograniczenie<br>występowania szkodników)                                                               |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | 0,15 - 0,2% (150 - 200 ml preparatu)    | mszyce (średni poziom<br>zwalczania szkodników)                                                                |



REGULATORY  
WZROSTU

| Uprawa                                                                                                  | Dawka (l,kg)/ha                                              | Termin stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC, MEROS 250 EC<br>(substancja aktywna: trineksapak etylu - 250 g/l) |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pszenica ozima                                                                                          | 0,4 l<br>Liczba zabiegów: 1.                                 | Stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39). Można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: POWER GRAIN 250 EC/ TRI-TURBO 250 EC/MEROS 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.<br>Termin stosowania: stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33), liczba zabiegów: 1.<br><br>POWER GRAIN 250 EC/ TRI-TURBO 250 EC/MEROS 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:<br>w fazie początku strzelania źdźbła (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha, liczba zabiegów: 2.<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych). |
| Jęczmień ozimy                                                                                          | 0,6 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. | Od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Żyto ozime                                                                                              | 0,3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. | Od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pszennyto ozime                                                                                         | 0,6 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. | Od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pszenica jara                                                                                           | 0,4 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. | Od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jęczmień jary                                                                                           | 0,4 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1. | Od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

REGULATORY WZROSTU

| Uprawa                                                                                                  | Dawka (l,kg)/ha                                                | Termin stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC, MEROS 250 EC<br>(substancja aktywna: trineksapak etylu - 250 g/l) |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Owies siewny                                                                                            | 0,4 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.   | Stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34). Można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: POWER GRAIN 250 EC/ TRI-TURBO 250 EC/MEROS 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha. |
| Rzepak ozimy                                                                                            | 1,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.   | Od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55).                                                                 |
| Rzepak jary,<br>Rzepak ozimy                                                                            | 1,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.   | Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55).                                                 |
| Żyto jare                                                                                               | 0,3 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.   | Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).                                                                                                                                                        |
| Koniczyna czerwona - produkcja nasienna                                                                 | 1,5 l<br>Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.   | Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39).                                                                                                                                                                |
| Trawy - produkcja nasienna                                                                              | 0,8 l<br>Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. | Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37).                                                                                                                                                      |



| Uprawa                                                                                                                             | Dawka (l,kg)/ha | Termin stosowania                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUPROSAL® 50, POWER MIEDŹ 50, MAGIC MIEDŹ 50<br>(Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych: miedź (Cu) całkowita - 50% (m/m)) |                 |                                                                                                                                                                                   |
| Jabłonie i grusze                                                                                                                  | 1,5 kg          | Stosować po ruszeniu wiosennej<br>wegetacji do początku kwitnienia 1-2 zabiegi<br>oraz po zbiorach owoców.                                                                        |
| Wiśnie i czereśnie                                                                                                                 | 3 kg            | Stosować po ruszeniu wegetacji i po zbiorach<br>owoców.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                    | 1,5 kg          | Stosować w okresie kwitnienia.                                                                                                                                                    |
| Śliwy                                                                                                                              | 3 kg            | Po ruszeniu wegetacji.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                    | 2-3 kg          | W okresie opadania liści.                                                                                                                                                         |
| Brzoskwinie                                                                                                                        | 5-7 kg          | Bardzo wczesną wiosną i jesienią po opadnięciu<br>liści.                                                                                                                          |
| Pomidor                                                                                                                            | 2,5-3 kg        | 2 tygodnie po wysadzeniu rozsady, następnie 1-3<br>zabiegi w odstępach 14 dni.                                                                                                    |
| Ogórek                                                                                                                             | 2,5-3 kg        | Gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat,<br>do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga<br>typowy kształt i wielkość zbiorczą.<br>Stosować 1-3 zabiegi w odstępach 14 dni. |
| Winorośl                                                                                                                           | 2,5 kg          | Przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu,<br>w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość<br>grochu. Stosować 1-3 razy w sezonie w odstępach<br>co 10-14 dni.                   |
| Porzeczki                                                                                                                          | 3 kg            | Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po<br>kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować 1-3 razy<br>w sezonie w odstępach co 10-14 dni.                                                    |

| Uprawa                                                                                                                                 | Dawka (l,kg)/ha | Termin stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KUPROSAL® 50, POWER MIEDŹ 50, MAGIC MIEDŹ 50<br>(zadeklarowana zawartość składników pokarmowych: miedź (Cu) całkowita - 50% (m/m))     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Orzech włoski, orzech laskowy                                                                                                          | 2-3 kg          | Od momentu pękania paków do czasu kwitnienia<br>kwiatów żeńskich. Stosować 1-2 zabiegi w odstępach<br>co 7-14 dni.                                                                                                                                                                                       |
| Fasola szparagowa                                                                                                                      | 3 kg            | W czasie kwitnienia i po kwitnieniu. Stosować 1-2<br>razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni.                                                                                                                                                                                                             |
| Pozostałe uprawy                                                                                                                       | 0,5-1,0 kg      | W okresie intensywnego wzrostu.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IN-CORNO®<br>(składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6 % (m/m),<br>mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/m)) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kukurydza                                                                                                                              | 10 l            | Zabieg doglebowy:<br>można wykonać na dwa sposoby<br>1) przed siewem tuż przed agregatowaniem<br>(dobrze wymieszać z glebą),<br>2) podczas siewu jako startowy nawóz, zabieg<br>wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej).<br>Zalecana ilość wody: 500 L/ha.                                          |
|                                                                                                                                        |                 | Zabieg nalistny:<br>wykonać aplikację we wczesnej fazie wzrostu<br>kukurydzy (BBCH 12), najlepiej 2-3 tygodnie po<br>siewie. Zalecana ilość wody: 500 L/ha.                                                                                                                                              |
| Rzepak ozimy                                                                                                                           | 10 l            | Zabieg nalistny:<br>wykonać w czasie rozwoju liści:<br>1) liście nie całkowicie rozwinięte (BBCH 10),<br>2) faza drugiego liścia (BBCH 12). Zalecana ilość<br>wody: 500 L/ha.                                                                                                                            |
| Trawniki,<br>ogrody przydomowe                                                                                                         | 10 l            | Produkt stosować w trakcie całego sezonu<br>wegetacyjnego, zapobiegawczo, w wilgotnych<br>warunkach. Aplikacje wykonywać w odstępie<br>2 tygodni". Zaleca się powtarzać aplikacje do<br>późnego lata. Zabiegi wykonywać wieczorem.<br>Zalecana ilość wody: 1000 L/ha.                                    |
| Szkołki drzew iglastych                                                                                                                | 10 l            | Pierwsza aplikacja podczas sadzenia /przesadzania<br>przez zraszanie, a następnie zaleca się powtórzyć<br>aplikacje (2 do 3 razy) z zachowaniem 14-dniowego<br>odstępu. Aplikację należy przeprowadzić ponownie<br>3 razy od lipca z zachowaniem odstępu 3-4 tygodni.<br>Zalecana ilość wody: 1000 L/ha. |



| Uprawa                                                                                                                                     | Dawka (kg/ha)                      | Termin stosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IN-PATATA*</b><br>(składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/m), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6% (m/m)) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ziemniak                                                                                                                                   | 10 l                               | Zabieg dogłębny:<br>podczas sadzenia jako startowy nawóz (sądzarka z aplikatorem / specjalizowanym rozpylaczem).<br>Zalecana ilość wody: 500 l/ha.<br><br>Zabieg nawoju:<br>zabieg wykonać zapobiegawczo przed wystąpieniem czynnika stresowego dla roślin. Powtarzać aplikację nawoju z zachowaniem 3 tygodniowych odstęgów.<br>Zalecana ilość wody: 500 l/ha.                                            |
| Marchew, seler (warzywa korzeniowe)                                                                                                        | 10 l                               | Zabieg dogłębny:<br>opryskanie gleby przed siewem lub podczas sadzenia jako startowy nawóz. Zabieg wykonać metodą in-kurwe (do brzozy/siewu) / do rzędów, aby produkt znalazł się wokół nasion. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.<br><br>Zabieg nawoju:<br>BBCH 10, BBCH 12, BBCH 15, BBCH 20, BBCH 40                                                                                                   |
| Truskawka (cecznie odmiany)                                                                                                                | 10 l                               | Pierwszy zabieg zaraz po sadzeniu, następnie drugi zabieg po 3 tygodniach (zapobiegawczo) i kolejne trzy zabiegi z zachowaniem 2 tygodniowej przerwy. Jedyn truskawkę sadzoną w tym samym czasie, wykonać zabieg w BBCH 19, BBCH 45, BBCH 55, BBCH 65 i ostatni do 3 tygodni przed ostatnim zbiorom. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha (zawieszanie kropelkowe).                                              |
| <b>IN-FRUTTO*</b><br>(składniki pokarmowe: cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 0,5% (m/m), mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 1,9% (m/m)) |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drzewa owocowe (jabłko)                                                                                                                    | 10 l<br>(20 l przy wysokim ściśle) | Pierwszy zabieg wykonać najlepiej podczas pełnego pąku liściowych**. Powtarzać aplikację nawoju 2-4 razy w odstępie 2 tygodni. Dodatkową 1 aplikację podczas opadania liści, przed zimowaniem. Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.<br><br>**Zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 70 – początek opadania owoców (cecznowe opadanie), bierzemy pod uwagę przebieg warunków pogodowych. |

\*W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników - opryskiwacz: pierwszy zabieg wykonać około maja. Następnie zabieg powtórzyć w odstępie 2 tygodni. Kolejną aplikację wykonać na przełomie lipca/sierpnia. Zabieg powtórzyć 1 lub 2 razy z 2 tygodniowymi odstępami. W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników - sarna nasadzeniach, konieczne: pierwszy zabieg wykonać w sierpniu. Zabieg powtórzyć po 3 tygodniach (cecznowe). Kolejne zabiegi wykonać od połowy kwietnia (z sarną z 1 tygodniowymi odstępami). W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników - sarna nasadzeniach: pierwszy zabieg wykonać pod koniec maja/na początku czerwca. Następnie aplikację można powtórzyć w odstępie dwóch tygodni. Zaleca się powtarzać aplikację do połowy lata w zależności od obecności czynników stresowych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie węgierskim: kukurydza - 3-5 zabiegów w 1 hektarze, rzepak zimny - 2 zabiegi nawoju, trawki, ogrody przydomowe - 2-5 zabiegów nawoju (ogrody przydomowe - opryskiwacz z aplikacją gniazdo, trawki - opryskiwacz z aplikacją do góry po ściśnięciu trawki), szlachetne drzewa glebkie - 7 zabiegów (cecznowe).

\*\*Zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 70 – początek opadania owoców (cecznowe opadanie), bierzemy pod uwagę przebieg warunków pogodowych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie węgierskim: jabłko - 3-4 zabiegi.

| Dawka (l, kg/ha)                                              | Zastosowanie                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HYDRON</b><br>(skład: mieszanica surfaktantów niejonowych) |                                                                                                                                                                                                           |
| Zalecane stężenie adjuwantu HYDRON w cieczy roboczej - 0,2 %  | Adjuwant do zastosowania z herbicydami dogłębowymi w każdej uprawie sarną i jarną.                                                                                                                        |
| <b>OLEO® 84 EC</b><br>(skład: 84% olej mineralny)             |                                                                                                                                                                                                           |
| 1,5 l/ha                                                      | Można stosować z większością agrotechnologii, dla których zalecane jest stosowanie z adjuwantem. OLEO 84 EC zalecany jest do stosowania w zabiegach agrotechnicznych na dużych powierzchniach uprawowych. |

synthos  
AGRO

Dzięki wzajemnej  
współpracy możemy  
osiągać **więcej**

Dołącz do nas:

- SynthosAGRO
- SynthosAGRO ochrona upraw
- z\_mysla\_o\_polskich\_plonach



KIEROWNICY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW:

- REJON 01: +48 605 101 192
- REJON 02: +48 506 478 805
- REJON 03: +48 605 101 179
- REJON 04: +48 887 778 799

Użytkownicy ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytać informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwrócić uwagę na stosowanie symboli ostrzeżenia umieszczone na etykietach produktów.